

سقط جنین طبی	سقط جنین ذریعه جراحی	تست‌های مورد ضرورت
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تست خون - قبل و بعد از آن</li> <li>• وقت سونوگرافی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تست خون - قبل از آن</li> <li>• وقت سونوگرافی</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• باید قبل از هفته 9 ام حاملگی انجام شود</li> <li>• به طور معمول بعد از هفته 6 ام انجام می‌شود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بطور معمول بعد از هفته 6 ام حاملگی انجام می‌شود</li> <li>• بعد از هفته 12 ام حاملگی، مصارف آن کلان می‌شود</li> </ul>	زمان سنجی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دواهایی که در خانه‌تان یا یک مکان مناسب دیگری استفاده می‌شوند</li> <li>• گرفتگی و خونریزی شدید در چند ساعت اول خونریزی خفیف معمولاً حدود 2 هفته طول می‌کشد اما ممکن است تا 6 هفته ادامه یابد</li> <li>• تبلت های مُسکین و ضد تهوع توصیه می‌شود</li> <li>• برای اطمینان از کامل شدن سقط، یک قرار ملاقات ضرورت دارد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضرورت به یک بی‌هوشی سبک دارد</li> <li>• رویه عملیات در کلینیک عملیات روزانه انجام آن حدود 10 دقیقه طول می‌کشد</li> <li>• تا 4 ساعت زمان نقاهت در کلینیک عملیات روزانه</li> <li>• بعضی وقت‌ها خونریزی خفیف تا 2 هفته یا بدون خونریزی</li> <li>• آنتی بیوتیک تجویز می‌شود</li> <li>• صرف در صورت وجود عارضه یا تشویش، وقت ملاقات بگیرید</li> </ul>	رویه
<ul style="list-style-type: none"> <li>• در 24 ساعت اول پس از مصرف دواها باید یک شخص کلانسال مسئولیت‌پذیر برای حمایت، کنار خود داشته باشید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• به یک شخص کلانسال مسئولیت‌پذیر ضرورت دارید تا شما را با خود از کلینیک عملیات روزانه به خانه ببرد</li> <li>• بعد از عمل، رانندگی کرده نمی‌توانید</li> </ul>	حمایت و بازیابی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خونریزی و گرفتگی عضلات، انتظار می‌رود</li> <li>• تب، لرز، تهوع و استفراغ نیز ممکن است پیش آید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ممکن است به دلیل بیهوشی، احساس خستگی کنید</li> <li>• ممکن است خونریزی و گرفتگی خفیف داشته باشد - بطور معمول کمتر از 2 هفته طول می‌کشد</li> </ul>	اثرات جانبی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خونریزی شدید</li> <li>• عفونت</li> <li>• سقط ناقص</li> <li>• ادامه حاملگی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آسیب به پوشش داخلی رحم یا دهانه رحم</li> <li>• عفونت</li> <li>• سوراخ شدن رحم (یک سوراخ کوچک)</li> <li>• واکنش به دواهای بیهوشی</li> </ul>	عوارض / خطرات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عوارض برای سقط جنین ذریعه جراحی و طبی بسیار نادر است</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تا هفته 9 ام حاملگی در تمام کلینیک‌های FPNSW انجام می‌شود</li> <li>• ضرورت به 3 وقت ملاقات - ارزیابی، تجویز و پیگیری دارد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تا 12 هفته + 6 روز حاملگی در Chatswood انجام می‌شود</li> <li>• ضرورت به 2 وقت ملاقات - ارزیابی و رویه دارد</li> </ul>	دسترسی در FPNSW

## برای کسب معلومات بیشتر

پلان گذاری فامیلی NSW Talkline -  
1300 658 886 یا [www.fpnsw.org.au/talkline](http://www.fpnsw.org.au/talkline)

خدمات رله ملی (برای اشخاص ناشنوا) -  
13 36 77

خدمات ترجمان شفاهی ملی TIS -  
131 450

به نزدیکترین کلینیک پلان گذاری فامیلی NSW  
مراجعه کنید -  
[www.fpnsw.org.au/clinics](http://www.fpnsw.org.au/clinics)

ورقه معلوماتی مراجعه‌کنندگان کلینیک پلان  
گذاری فامیلی NSW -

[https://www.fpnsw.org.au/factsheets/  
individuals/cervical-screening/hpv-vaccination](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

منبع مراجعه‌کنندگان کلینیک پلان گذاری فامیلی NSW -  
<https://www.fpnsw.org.au/changes>

www.fpnsw.org.au | خط صحبت 1300 658 886 | بنگاه

خدمات و معلومات بالینی | تعلیم و پرورش | تحقیق | توسعه بین المللی  
پلان گذاری فامیلی NSW یک سازمان غیرانتفاعی است که ذریعه وزارت صحت عامه NSW تأمین مالی می شود

معلومات این ورقه معلوماتی صرف برای اهداف تعلیمی تهیه شده است. پلان گذاری فامیلی (FPNSW) NSW تمام احتیاط ها را برای اطمینان از صحت و درستی این معلومات انجام داده است.  
به روز در زمان انتشار. این مطلب هدف ارائه توصیه های صحنی خاص یا جایگزینی برای توصیه های شخصی از یک متخصص مواظبت های صحنی نمی باشد. حق چاپ @ FPNSW 2018.  
کاپی غیرمجاز این ورقه، مجاز نیست. بازبینی: اکتبر 2020