

## การทำแท้งด้วยการผ่าตัดหรือการทำแท้งโดยใช้ยา – มีความแตกต่างกันอย่างไร?

	การทำแท้งด้วยการผ่าตัด	การทำแท้งโดยใช้ยา
การทดสอบที่ จำเป็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับการตรวจเลือด - ก่อน</li> <li>วันที่ทำอัลตราซาวนด์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับการตรวจเลือดก่อนและหลัง</li> <li>ระบุวันที่ทำอัลตราซาวนด์</li> </ul>
เวลา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปกติกระทำหลังจากครรภ์มีอายุ 6 สัปดาห์</li> <li>ราคาจะสูงมากขึ้นหลังจากที่ครรภ์มีอายุเกิน 12 สัปดาห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้องทำก่อนอายุครรภ์ 9 สัปดาห์</li> <li>โดยปกติกระทำหลังจากที่ครรภ์มีอายุ 6 สัปดาห์</li> </ul>
กรรมวิธี	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำเป็นต้องใช้ยาชาขนาดอ่อน</li> <li>รับการผ่าตัดที่คลินิกศัลยกรรมวันเดียว</li> <li>การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 10 นาที</li> <li>มีเวลาพักฟื้นสูงสุด 4 ชั่วโมงในคลินิกศัลยกรรมวันเดียว</li> <li>บางครั้งอาจมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยนานถึง 2 สัปดาห์หรือไม่มีเลือดออกเลย</li> <li>มีการให้ยาปฏิชีวนะ</li> <li>มีการนัดหมายต่อไปเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีข้อกังวลใด ๆ เกิดขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยาที่รับประทานเองที่บ้านหรือในที่ที่ปลอดภัยอื่น ๆ</li> <li>เป็นตะคริวและมีเลือดออกหนักในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรก</li> <li>ปกติจะมีเลือดออกเล็กน้อยเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แต่อาจนานถึง 6 สัปดาห์ก็ได้</li> <li>ขอแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดและยาแก้คลื่นไส้</li> <li>จำเป็นต้องมีการนัดหมายเพื่อติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์</li> </ul>
การสนับสนุนและ การพักฟื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบพาคุณกลับบ้านจากคลินิกศัลยกรรม</li> <li>คุณไม่สามารถขับรถได้หลังจากการผ่าตัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณจะต้องมีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบคอยช่วยเหลือใน 24 ชั่วโมงแรกหลังจากที่ได้รับประทานยา</li> </ul>
ผลข้างเคียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาจรู้สึกอ่อนเพลียจากยาสลบ</li> <li>อาจมีเลือดออกและเป็นตะคริวเล็กน้อย – โดยปกติจะมีอาการเช่นนี้อยู่ไม่ถึง 2 สัปดาห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คาดว่าอาจจะมีการเลือดออกและการเป็นตะคริว</li> <li>อาจมีไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ และอาเจียน</li> </ul>
ภาวะแทรกซ้อน/ ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบาดเจ็บที่เยื่อหุ้มสมองหรือปากมดลูก</li> <li>การติดเชื้อ</li> <li>ผนังมดลูกเป็นรู (รูเล็ก)</li> <li>ปฏิกิริยาต่อยาสลบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีเลือดออกมาก</li> <li>มีการติดเชื้อ</li> <li>การทำแท้งไม่สมบูรณ์</li> <li>เกิดขึ้น ไม่บ่อยนัก</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก</li> </ul>	
ขอรับบริการได้ที่ FPNSW	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้บริการกับผู้ที่มีอายุครรภ์สูงสุด 12 สัปดาห์ + 6 วันที่แท้งแล้ว</li> <li>จำเป็นต้องทำการนัดหมาย 2 ครั้ง – การประเมินอาการและกระบวนการผ่าตัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบริการทำแท้งให้แก่ผู้ที่มีอายุครรภ์ถึง 9 สัปดาห์ที่คลินิก FPNSW ทุกแห่ง</li> <li>จำเป็นต้องมีการนัดหมาย 3 ครั้ง – การประเมินอาการ การจ่ายยา และการติดตามผล</li> </ul>

### สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สายสนทนากับหน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐ  
นิวเซาท์เวลส์ ติดต่อที่ – [www.fpnsw.org.au/talkline](http://www.fpnsw.org.au/talkline)  
หรือ 1300 658 886

บริการส่งต่อสัญญาณแห่งชาติ: (สำหรับคนหูหนวก)  
ติดต่อที่ – 13 36 77

บริการแปลและล่ามแห่งชาติ (TIS) ติดต่อที่ –  
131 450

ไปที่คลินิกหน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่  
ใกล้ที่สุด ที่ – [www.fpnsw.org.au/clinics](http://www.fpnsw.org.au/clinics)

เอกสารข้อมูลลูกค้าหน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐ  
นิวเซาท์เวลส์ ดูได้ที่ –  
[https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/  
cervical-screening/hpv-vaccination](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

แหล่งข้อมูลลูกค้าการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์  
ดูได้ที่ – <https://www.fpnsw.org.au/changes>

[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | โทร 1300 658 886 | ร้านค้า

บริการและข้อมูลทางคลินิก | การศึกษาและการฝึกอบรม | วิจัย | การพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้อมูลในแผ่นข้อเท็จจริงนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยหน่วยการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์ (FPNSW) ได้ใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ตีพิมพ์ ไม่ได้มี  
จุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะหรือเปลี่ยนคำแนะนำส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ลิขสิทธิ์ © FPNSW 2018

ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำแผ่นข้อเท็จจริงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต รีวิวมือ: ตุลาคม 2020